

Tajniki plewienia – jak rozróżnić chwast od rośliny uprawnej?

Potrzebne narzędzia:

- rękawice
- kultywator trójzębny
- motyka
- wiaderko na chwasty
- sznurek i patyki



Kultywator trójzębny (Źródło: agrivalsugana.it)

Jak plewić – krok po kroku:

1. Używając sznurka i dwóch patyków zaznacz główny rząd roślin uprawnych, aby podkreślić ważność głównych upraw i skupić się na międzyrzędziach. Teraz możesz swobodnie plewić pomiędzy rzędami wytyczonymi sznurkami.
2. Podczas identyfikowania chwastów zwróć uwagę na jego kluczowe części budowy takie jak rozległe, mocne korzenie albo rozetkowatą budowę.
3. Używając kultywatora trójzębnego rozluźnij ziemię i przystąp do usuwania chwastów z poletka. Upewnij się, że usunięte zostały wszystkie części rośliny, zarówno korzenie jak i pędy. Skoncentruj się na międzyrzędziach w pierwszej kolejności. Delikatnie otrząśnij chwasty przy usuwaniu ich z podłoża, pozostawiając resztki ziemi na rabatach, a chwasty umieszczając w wiaderku.
4. Postaraj się oddzielić „dobre chwasty”, które mogą być skompostowane (np. drobne rośliny jednoroczne z cienkimi korzeniami), od tych „złych chwastów” z grubymi lub rozległymi korzeniami (byliny), które powinny znaleźć się z dala od kompostownika.
5. Po wyplewieniu, używając motyczki przekop pusty teren, upewniając się, że wszystkie korzenie zostały usunięte z podłoża.
6. Po tak wyplewionych międzyrzędziach można przystąpić to usunięcia chwastów z okolic roślin uprawnych.
7. Opróżnij wiadro, wyczyść narzędzia i schowaj je.

Najpopularniejsze chwasty w ogrodzie:

- babka lancetowata
- bodziszek drobny
- bylica pospolita
- komosa biała
- krwawnik pospolity
- miotła zbożowa
- mlecz polny
- mniszek pospolity
- nawłóć kanadyjska
- perz właściwy
- podagrycznik pospolity
- psianka czarna
- rdest ptasi
- szczaw polny
- wiechlina roczna

Na kolejnej stronie znajduje się tabela z wykazem gatunków najpopularniejszych chwastów.

CHWASTY W OGRODZIE

babka lancetowata



bodziszek drobny



bylica pospolita



komosa biała



krwawnik pospolity



miotła zbożowa



mlecz polny



mniszek lekarski



nawłóć kanadyjska



perz właściwy



podagrycznik pospolity



psianka czarna



rdest ptasi



szczaw polny



wiechlina roczna



Różnice pomiędzy mleczem a mniszkiem:

Mlecz polny



Mniszek lekarski



Źródło: gazetasenior.pl

- **mlecz** ma jeden główny pęd, z którego wyrastają mniejsze boczne i jest cały pokryty liśćmi, a zakończone są licznymi kwiatami
- **mniszek** może mieć jedną lub kilka łodyg, które są nieulistnione, a na ich szczycie znajduje się tylko jeden kwiat, liście natomiast wyrastają pojedynczo ponad ziemię układając się w rozetę